

EFEK SAMPING OBAT

Efek samping ringan dapat berupa :

1. Berubahnya warna urine menjadi merah yang diakibatkan oleh rifampisin.
2. Adanya nyeri sendi dan kesemutan.
3. Tidak nafsu makan dan mual.
4. Gatal dan kemerahan pada kulit.

CARA MINUM OBAT

1. Waktu minum obat yang baik adalah waktu pagi hari saat perut kosong atau pada malam hari sebelum tidur dengan jumlah obat sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan.

2. OAT harus diminum dalam satu dosis.

3. Mengetahui kemajuan pengobatan.

Untuk mengetahui kemajuan pengobatan ini PMO dapat melakukan langkah ATP (Amati, Tanyakan, Periksa)

AKIBAT OBAT TIDAK DIMINUM TERATUR

1. Pasien dapat menularkan TB ke orang lain terutama orang yang tinggal serumah dan lingkungan sekitarnya.
2. Penyakit TB sulit untuk diobati karena kuman TB menjadi kebal.
3. Obat menjadi lebih mahal, lebih lama dan belum dapat dilakukan di semua fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Pasien akan mengulang pengobatan TB.



TOSS TBC

Temukan TBC
Obati Sampai
Sembuh !

L.E/FARM/05

PENGOBATAN TBC DAN PMO

RSUP dr. KARIADI

Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang 50244

Fax. 024-8318617, Telp. 024-8413476

SMS Pengaduan : 08886509262

Email : info@rskariadi.co.id

Website : www.rskariadi.co.id

PENGOBATAN TB

Obat TB harus diminum secara teratur TBC dapat diobati dengan obat Anti TB (OAT) yang bisa diperoleh secara gratis di fasilitas pelayanan kesehatan.

HARUS ADA PMO DALAM PENGOBATAN TB

APA ITU PMO ?

Pengertian

Kependekan dari **Pengawas Minum Obat**

Kriteria

Seseorang yang dikenal, dapat dipercaya, dan tinggal dekat dengan pasien, bersedia membantu pasien, patuh terhadap instruksi dan bersedia untuk diberi penyuluhan bersama-sama dengan pasien.



SIAPA YANG BISA JADI PMO?

Seseorang yang dikenal, dapat dipercaya, dan tinggal dekat dengan pasien, bersedia membantu pasien, patuh terhadap instruksi dan bersedia untuk diberi penyuluhan bersama-sama dengan pasien.

APA TUGAS PMO?

1. PMO bertanggungjawab memastikan pasien TB meminum obat sesuai dengan anjuran.
2. Mengawasi pasien agar pasien menelan obat secara teratur.
3. Memberi dorongan kepada pasien agar pasien meminum obat sesuai jadwal.
4. Pastikan bahwa obat yang diminum benar.
5. Mengingatkan pasien untuk pemeriksaan ulang dahak sesuai jadwal.
6. PMO bisa menjadi sahabat pasien.

PRINSIP PENGOBATAN TB

Tahap Pengobatan

Pengobatan TB diberikan dalam 2 tahap, yaitu:

1. Tahap Intensif, dalam tahap ini obat diminum tiap hari selama 2-3 bulan
2. Tahap lanjutan, dalam tahap ini obat diminum 3 kali seminggu selama 4-5 bulan.

Jenis Obat yang Diberikan

1. Isoniazid
2. Pirazinamid
3. Rifampicin
4. Streptomycin
5. Ethambutol

