

# INFORM CONSENT

KAMI MOHON KESEDIAAN BAPAK/IBU UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI DAN MELAPORKAN APABILA TERJADI EKSTRAVASASI SETELAH MENDAPAT OBAT KEMOTERAPI KEPADA KAMI (TIM EKSTRAVASASI) UNTUK DICATAT SEBAGAI PELAPORAN KEJADIAN EKSTRAVASASI DIRUMAH

PELAPORAN YANG BAPAK/IBU BERIKAN AKAN MENJADI DATA KAMI UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN EVALUASI DAN KEMAJUAN PELAYANAN KEMOTERAPI KAMI.



KIRIM KAN LAPORAN DALAM FORMAT SMS/WHATSAPP KE NOMER :

**081 327 518 396**

FORMAT :

- 1) Nama :
- 2) Tanggal kemoterapi :
- 3) Obat kemoterapi :
- 4) Jenis ekstravasasi :
- 5) Penanganan yang dilakukan dirumah :

**TIM EKSTRAVASASI  
RUANG KEMOTERAPI KASUARI  
RSUP DR. KARIADI  
SEMARANG**



## PELAPORAN EKSTRAVASASI DIRUMAH

**Ruang Kemoterapi Kasuari  
RSUP Dr. Kariadi Semarang**



Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang 50244  
Fax. 024 - 8318617 | Telp. 024 - 8413476  
Call Center : 024 - 8450800  
SMS Pengaduan : 0888 650 9262  
email: [humas\\_rskariadi@yahoo.co.id](mailto:humas_rskariadi@yahoo.co.id)  
Website : [www.rskariadi.co.id](http://www.rskariadi.co.id)



# EKSTRAVASASI

**Ekstravasasi** adalah kebocoran obat atau cairan dari vena ke jaringan sekitar yang sehat selama pemberian obat kemoterapi (Hadway,2007)

Ekstravasasi disebut juga sebagai kebocoran obat kemoterapi ke dalam jaringan sekitar lokasi pemberian infus kemoterapi sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan ringan hingga kehitaman seperti jaringan mati dan komplikasi lain (White et al, 2012)



## JENIS DAN PENANGANAN EKSTRAVASASI DI RUMAH

### 1. Ekstravasasi Ringan

- Tanda - tanda :
  - Kemerahan pada area bekas penusukan kanul infus
  - Nyeri pada daerah penusukan kanul infus seperti rasa terbakar dan panas yang menjalar

#### b. Penanganan :

- Berikan kompres dingin kecuali obat golongan Vinca alkaloid seperti Vincristin, Vinoralbin, Vinblastin diberikan kompres hangat.
- Istirahatkan daerah ekstremitas selama 48 jam
- Berikan hidrokortison salep

### 2. Ekstravasasi Berat

- Tanda - tanda :
  - Terjadi perubahan kulit yang sangat nyata seperti menjadi lebih hitam
  - Muncul bula atau luka seperti luka bakar dari daerah penusukan infus sampai melebar ke daerah sekitarnya
  - Nyeri hebat pada area penusukan infus

#### b. Penanganan :

- Konsumsi obat anti nyeri
- Berikan hidrokortison salep
- Kunjungi petugas kesehatan untuk penanganan lebih lanjut
- Istirahatkan ekstremitas selama 48 jam